

DYNEXAN MUNDGEL®

Wirkstoff:

- Lidocain-HCl

Anwendungsgebiete:

- Zur zeitweiligen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen

Dosierstärke:

- 1 g Gel enthält 20 mg Lidocainhydrochlorid.

Packungsgrößen:

- Tube mit 1.0 g (PZN 01662915)
- Tube mit 30 g (PZN 01662921)

Anwendung und Dosierung:

- Erwachsene: 4- bis 8-mal täglich
- Kinder und Säuglinge: max. 4-mal täglich
- Eine erbsengroße Menge reicht zur gezielten Anwendung völlig aus.
- Das Gel wird auf die schmerzenden Stellen aufgetragen und leicht einmassiert. Ggf. die betreffende Stelle vor der Anwendung z. B. mit einem Wattestäbchen trocken tupfen.
- Der Wirkstoff von DYNEXAN MUNDGEL® wirkt hemmend auf die Schmerzweiterleitung und stoppt so den Schmerz.



Gut zu wissen:

DYNEXAN MUNDGEL®

- ▶ Stoppt den Schmerz bei z. B. Aphthen, Druckstellen, Zahnfleischentzündungen, Lippenherpes und Zahnung
- ▶ Schneller Wirkeintritt innerhalb von 60 Sekunden
- ▶ Sehr gutes Nebenwirkungsprofil (< 0,01%)
- ▶ Alkohol-, zucker-, gluten- und laktosefrei
- ▶ Für Erwachsene, Kinder und Babys geeignet
- ▶ Rezeptfrei in der Apotheke
- ▶ Als apothekenpflichtiges Arzneimittel für Kinder bis 12 Jahre erstattungsfähig

Hier gehts zum Download:

- **Seniorenratgeber – Zahn- und Mundgesundheit**
- **Elternratgeber – Die ersten Zähnen**

<https://www.kreussler-pharma.de/service/downloads/>



Stoppt den Schmerz im Mund.

Schnell wirkendes Arzneimittel zur Schmerzlinderung bei Aphthen, Entzündungen, Verletzungen sowie Wund- und Druckbeschwerden an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen und bei Durchbruch der Weisheitszähne

www.dynexan.de



Frei von Alkohol,
Zucker, Gluten
und Laktose



Wirkt
innerhalb von
60 Sekunden¹



Wirksamkeit und Verträglichkeit in klinischen Studien belegt^{1,2}

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Rheingaustraße 87-93, D-65203 Wiesbaden
E-Mail: info@kreussler.com Tel.: 0611 9271-223

kreussler
PHARMA

¹ Gruber et al. Quintessenz 1990; ² Kasaj et al. Eur J Med Res. 2007

DYNEXAN MUNDGEL®. Zusammensetzung: 1 g Gel enthält: Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid 1 H₂O 20 mg; weitere Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Bitterfenchelöl, Glycerol, Guargalaktomannan, Minzöl, dickflüssiges Paraffin, Pfefferminzöl, Saccharin-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Sternanisöl, Thymol, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: zur zeitweiligen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen. Gegenanzeigen: absolut: Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen von DYNEXAN MUNDGEL® oder gegen andere Lokalanästhetika vom Säureamid-Typ. Relativ: Patienten mit schweren Störungen des Reizbildungs- und Reizleitungssystems am Herzen, akuter dekompensierter Herzinsuffizienz und schweren Nieren- oder Lebererkrankungen. Nebenwirkungen: sehr selten (< 0,01% einschließlich Einzelfälle): lokale allergische und nichtallergische Reaktionen (z. B. Brennen, Schwellungen, Rötungen, Jucken, Urtikaria, Kontaktdermatitis, Exantheme, Schmerzen), Geschmacksveränderungen, Gefühllosigkeit, anaphylaktische Reaktionen und Schockreaktionen mit begleitender Symptomatik. Stand: März 2021. Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, D-65203 Wiesbaden.